



*For English – go to page 4.

Riktlinjer vid sjukdom

Vi utgår alltid från barnets bästa och barnets allmäntillstånd. Mår barnet inte bra och inte orkar med en dag på förskolan så ska barnet vara hemma. Tänk på att det är skillnad på att vara hemma och att vara på förskolan; barnet kan verka frisk och pigg hemma, men på förskolan krävs det mer. Det är ett högre tempo, mer intryck, fler barn och mer krävande aktiviteter. Stanna hellre hemma en dag extra så att barnet blir helt friskt istället för att komma tillbaka till förskolan för tidigt. Det mår både barnet och de övriga på förskolan bättre av.

Diarré, kräkning och magsjuka – Barnet ska vara hemma i minst 48 timmar efter sista kräkning eller diarré och tills barnet kan äta normalt.

Meddela förskolan om att barnet har fått magsjuka, då det är extra smittsamt och vi behöver gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Feber – Barnet ska vara feberfri i minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Förkylning – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Halsfluss – Om barnet har haft en infektion med streptokocker ska barnet stanna hemma från förskolan i minst två dygn med antibiotikabehandling. Efter det måste barnet vara tillräckligt pigg för att orka med en hel dag i förskolans verksamhet. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.



Höstblåsor – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Meddela förskolan om att barnet har fått höstblåsor, då det är extra smittsamt och vi behöver gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Influensa – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Kikhosta – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Löss – Så fort barnet har börjat behandlas med lusmedel kan barnet komma tillbaka till förskolan.

Meddela förskolan om att barnet har fått löss, då det är extra smittsamt och vi behöver gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Mollusker – Mollusker brukar försvinna av sig självt efter ett par månader. Barnet kan gå på förskolan som vanligt.

Ringorm – Barnet kan komma tillbaka till förskolan ett dygn efter påbörjad behandling.

Meddela förskolan om att barnet har fått ringorm, då det är extra smittsamt och vi behöver gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Svinkoppor – Barnen ska vara hemma från förskolan tills såren är helt torra.



Vattkoppor – Stanna hemma tills barnet är feberfritt i minst ett dygn utan febernedsättande medel, vattkopporna har torkat helt och barnet mår bra i övrigt (brukar ta ungefär en vecka).

Meddela förskolan om att barnet har fått vattkoppor, då det är extra smittsamt och vi behöver gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Ögoninflammation – Om barnet har var i ögonen ska barnet vara hemma, även om barnet mår bra i övrigt. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när inflammationen har läkt och ögat inte längre är varigt, samt att barnets allmäntillstånd är bra.

Öroninflammation – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfritt minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

För mer information: <https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/infektioner-hos-barn--smittguide/>



Guidelines when your child is sick

We always have the child's best interest in mind and base our judgement with the child's general condition in focus. If the child is not feeling well and doesn't have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. Bear in mind that there is a difference being at home and being at the preschool; the child can seem healthy enough at home, but at the preschool more is demanded of the child. At the preschool the pace is higher, there are more impressions, more children and more demanding activities. Let the child stay home one more day rather than come back to the preschool before the child is healthy enough. This will favor both the child and the others at the preschool.

Diarrhea, vomits and stomach flu – The child should stay home 48 hours after the last vomit or diarrhea, and should be able to eat normally.

If your child suffers from stomach flu you need to inform the preschool. Stomach flu is contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Fever – The child should be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.

Cold – Proceed from the child's general condition. If the child doesn't have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.

Tonsillitis – If the child has had an infection of streptococcus the child should stay home for at least two days with antibiotics treatment. After that the child should be healthy enough to have the energy to participate in the activities at the preschool. The child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.



Hand, foot and mouth disease (Höstblåsor) – Proceed from the child's general condition. If the child doesn't have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.

If your child suffers from hand, foot and mouth disease you need to inform the preschool. Hand, foot and mouth disease is contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

The flu – Proceed from the child's general condition. If the child doesn't have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.

Whooping cough – Proceed from the child's general condition. If the child doesn't have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.

Head lice – As soon as the child has started the lice treatment, she/he can come back to the preschool.

If your child suffers from head lice, you need to inform the preschool. Head lice are contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Water warts – It usually disappears by itself without treatment. The child can attend preschool as usual.

Ringworm – The child can come back to the preschool 24 hours after the child has started treatment.

If your child suffers from ringworm, you need to inform the preschool. Ringworm is contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.



Impetigo – The child should stay home from the preschool until the wounds is completely dry.

Chicken pox – Stay home from the preschool until the child is free from fever for at least 24 hours without antipyretics, the chicken pox is completely dry and the child is healthy enough to have the energy to participate in the activities at the preschool (usually takes about a week).

If your child suffers from chicken pox, you need to inform the preschool. Chicken pox is contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Conjunctivitis – If there is discharge from the child's eye, she/he should stay home, even if the child feels fine otherwise. The child can come back to the preschool when the inflammation has healed, and there is no discharge in the eye. The child's general condition also must be good.

Otitis – Proceed from the child's general condition. If the child doesn't have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the preschool.

For more information: <https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/infektioner-hos-barn--smittguide/>